



**PRO-XL**  
Complete & Concentrated

Valor recomendado EC 1.4 - 2.0  
PH 6.0 - 6.5

Tabla de cultivo: Hydro, cocos o algún sustrato **NO abonado**.

Semana	Pre-cosecha 1	Pre-cosecha 2	1	2	3	4	5	6	7	8
Luz	14 horas	18 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas	12 horas

Pre-Seed	0.5 ml/l	0.5 ml/l	0.5 ml/l	0.5 ml/l						
Grow-Add	1.75 ml/l	1.75 ml/l	2.5 ml/l	2.5 ml/l						
Bloom-Add					0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.5 ml/l
Quick Feed					0.5 ml/l	0.5 ml/l	0.5 ml/l			
Flower Feed								0.25 ml/l	0.25 ml/l	0.25 ml/l

Enemas					1 x 0.5 ml/l	1 x 0.5 ml/l	1 x 0.5 ml/l	1 x 0.5 ml/l	1 x 0.5 ml/l	3 x 0.5 ml/l
Bloom-Add					0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	0.4 ml/l	
Flower Feed	2 x semana	2 x semana	2 x semana							

Temperatura	Max 20° / Min 12°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°	Max 20° / Min 22°
HR	80%	80%	70%	70%	70%	50%	40%	40%	40%	40%

Stop Grow
Antes de la floración
Flower Feed
Pulverizar 2 veces por semana las plantas 2 semanas

- NOTAS**
- El valor de EC de la tabla se basa en un agua con un EC de 0.4. Si el valor de EC del agua es mayor, es aconsejable filtrar el agua. Si no se filtra el agua, debe seguirse igualmente las cantidades de los nutrientes que propone la tabla.
  - GROW** y **BLOOM-ADD**: Nunca se deben mezclar los líquidos juntos entre ellos. Mezclar bien el componente A con el agua del depósito y seguidamente, añadir el componente B.
  - QUICK BOOST & FLORA EXPLODER**: No usarlos a la vez, ni durante un mismo día.
  - STOP GROW**: Utilizar antes de la floración. Pulverizar sólo con la luz apagada. Necesita 12 horas seguidas un luz para impregnar. Aplicar 1 o 2 veces dependiendo de la reacción de la planta en el plazo de dos días.

[www.pro-xl.eu](http://www.pro-xl.eu) [info@pro-xl.eu](mailto:info@pro-xl.eu) Visita el apartado de tablas de nuestra página web para calcular los nutrientes que necesitas.

